

ARABIC SUMMARY

بسم الله الرحمن الرحيم

الملخص العربى

الهدف من هذا البحث هو ايجاد معدل الخلع الجزئى بمفعل
الفقرة الاولى والثانية (الفهق المحورى) نتيجة للاصابة بمرض
الروماتويد المفعل لدى الاطفال وقد اشتمل البحث على ٣٠ مريضا
بمرض الروماتويد المفعل لدى الاطفال المحدد طبقا لمواصفات
الجمعية الامريكية للروماتيزم.

وقد تم الكشف على جميع المرضى كشفا اكلينيكييا كاملا
اكلينيكييا عمى واجريت لهم الفحوص المعملية الاتية .

١- نسبة الهيموجلوبين بالدم .

٢- سرعة الترسيب بالدم .

٣- اختبار لاتكس (للكشف عن عامل الروماتويد) .

تم عمل اشعة X على الفقرات العنقية لجميع المرضى فى

الاضاع الاتية :

١- وضع الامامى خلفى .

٢- وضع جانبى اثناء اقمى اثناء الامامى وخلفى . وذلك

لقياس المسافة بين السطح الامامى للنتوء المعظمى

المحورى للفقره الثانية والسطح الخلفى للقوس الامامى

للفقره الاولى العنقية .

ويحدث هذا الخلع الجزئى فى المفعل الفهقى المحورى اذا

زادت هذه المسافة عن ٣,٥ ملليمتر ويكون الفرق فى هذه المسافة

اثناء الانحناء الامامى والخلفى ١,٠ ملليمتر .

وطبقا لنتائج هذه الدراسة فلقد ثبت ان الإصابة تحدث فى المرضى المصابون بمرض الروماتويد المفلى لدى الاطفال والتي تحدث فى البداية ذات النشالة العامة الشديدة وكذلك الإصابة المتعدده المفامل اما بالنسبة للعلاج فان حجر الاساس فى علاج هذه الحالات هو التحكم فى الالتهاب المينوفى بينما يظل باقى العلاج الغير جراحى علاجاً للاعراض. مثل استعمال قلادة مناعية رخوه للرقبة وتستعمل للعلاج النفسى للمريض، وازاله الالم وللد من حركة الرقبة.

وتستعمل القلادة اليابسة للحد من حركة المفمل ويستعمل شد الفقرات العنقية المتقطع للحد من هذا الخلع الجزئى ولكن لايعالج او يحسن حالات ضعف العضلات.

ولذلك فنحن ننصح بالقيام بعمل اشعة X للفقرات العنقية لمرضى الروماتويد المفلى لدى الاطفال وذلك لايجاد ايه تغييرات فى الفقرات العنقية.