

New trends in management of anal fissure

Mohammed Tag Eldien Yaseen

ال الشرخ الشرجي عبارة عن شرخ طولي في أسفل القناة الشرجية يصاحبه ألم مع نزيف شرجي أثناء وبعد عملية التبرز . غالبية الشروخ الشرجية تحدث في الجزء الخلفي من الشرج بنسبة 90% من حالات الشرخ الشرجي ونسبة 10% في الجزء الأمامي وأقل من 1% من الحالات لديهم شروخ شرجية في الجزء الأمامي والخلفي من الشرج . وباعتبار الإمساك وشدة تقلص عضلات الشرج من الأسباب المؤدية لحدوث الشرخ الشرجي . ومن أعراض الشرخ الشرجي ألم شديد في فتحة الشرج وخاصة أثناء وبعد عملية التبرز مصاحب مع نزيف شرجي . ويشمل علاج الشرخ الشرجي على استخدام المراهم المخدرة والموسعات الشرجية وبعض المواد المانعة للامساك . والألم الذي يصاحب عملية البراز يؤدي إلى التقلص الشديد في العضلة العاصرة الشرجية والذي يؤدي إلى النقص الشديد في كمية الدم التي تصل إلى تلك العضلة ويكون القطع الحراري هو الحل لتلك المشكلة . لكن هذا العلاج لا يخلو من المضاعفات التي تمثل في عدم القدرة على التحكم في البراز أو الغازات ومن هنا بدأت المحاولات لقطع العضلة العاصرة بالطرق الكيميائية ، مثل أكسيد التترريك الذي له دور هام في انبساط العضلة الشرجية الداخلية . وكان لاستخدام التتروجلسيرين نتائج مذهلة في علاج الشرخ الشرجي حيث أنه يسبب راحة سريعة ومستمرة من الألم وبدون أي آثار جانبية أو عودة للمرض مرة أخرى . إن الهدف من هذا البحث هو إلقاء الضوء على مرض الشرخ الشرجي والطرق الحديثة لعلاجه ومعرفة مزايا وعيوب كل طريقة سواء كانت علاج طبي أو تدخل جراحي .