



الأشخاص المصابون بأمراض قد تؤثر على وظيفة الغدة الدرقية مثل أمراض الكبد المزمنة ، أمراض الكلى المزمنة وأمراض سوء التغذية .- الأشخاص الذين يتعاطون بعض العقاقير الطبية مثل الجلوكوكورتيكويد ، الإستروجين ، أميودارونوالعقاقير التي تؤثر على وظيفة الغدة الدرقية ... الخ .- الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي سابق أو فحوصات أو يتعاطون علاج له علاقة بأمراض الغدة الدرقية .- الأشخاص الذين أجريت لهم جراحات في القلب مثل جراحات القلب المفتوح أو إجراء قسطرة بالقلب أو تركيب دعامة ... الخ ) .- المرضى المصابون بارتفاع ضغط الدم أو مرضى السكر : +++ ' ا + , ++ ا ! " ول \$ % م ا د - و- وجد أن معدل هرمونات التري أويودوثيرونين (الكلى والحر) ، الثيروكسين ( الكلى والحر) وهرمون التري . إس . إتش لم يتغير في المرضى المصابون بذبحة صدرية مستقرة بالمقارنة بالأشخاص الطبيعيين كما وجد أن معدل أنزيمات القلب ومستوى الدهون بالدم لم يتغير في هؤلاء المرضى بالمقارنة بالأشخاص الطبيعيين .- المرضى المصابون بذبحة صدرية غير مستقرة كانت لديهم معدلات منخفضة من هرمون التري أويودوثيرونين الكلى بالبالازما بالمقارنة بالأشخاص المصابون بذبحة صدرية مستقرة والأشخاص الطبيعيين كما وجد أن معدل هرمونات الثيروكسين الكلى والحر والتري أويودوثيرونين الحر وال تى . إس . إتش لم يتغير في هؤلاء المرضى بالمقارنة بالأشخاص المصابون بذبحة صدرية مستقرة والأشخاص الطبيعيين .4- المرضى المصابون بإحتشاء حاد بعضلة القلب كانت لديهم معدلات منخفضة من هرمون التري أويودوثيرونين الكلى بالبالازما بالمقارنة بالأشخاص المصابون بذبحة صدرية مستقرة والأشخاص الطبيعيين كما وجد أن معدل هرمونات الثيروكسين الكلى والحر والتري أويودوثيرونين الحر وال تى . إس . إتش لم يتغير في هؤلاء المرضى بالمقارنة بباقي المجموعات .- وجد أنه في المرضى المصابون بإحتشاء بعضلة القلب والذين حدثت لهم مضاعفات خطيرة كاتتمعدلات قياسات هرمونات التري أويودوثيرونين الكلى والثيروكسين الكلى وال تى . إس . إتش أقل إحصائيا من المرضى المصابون بإحتشاء بعضلة القلب ولم تحدث لهم مضاعفات خطيرة أثناء تواجدهم في الرعاية المركزة .- وجد أن مستوى قياسات الكولستيرول الكلى بالدم والكولستيرول منخفض الكثافة بالدم وأل تى . إس . إتش أعلى إحصائياً في المرضى المصابون بذبحة صدرية غير مستقرة بالمقارنة بالمرضى المصابون بذبحة صدرية مستقرة والأشخاص الطبيعيين .- وجد أن مستوى قياسات الكولستيرول الكلى بالدم والكولستيرول منخفض الكثافة بالدم والدهون الثلاثية بالدم أعلى في مرضى إحتشاء عضلة القلب من باقي المجموعات ومثيلاتها في الأشخاص الطبيعيين .- المرضى المصابون بإحتشاء حاد بعضلة القلب كانت لديهم معدلات مرتفعة من إنزيمات القلب بالمقارنة بباقي المجموعات. أن : +++ ن هذا ا + % -و- قد توجد تغيرات في هرمونات الغدة الدرقية وال تى . إس . إتش في مرضى قصور الشريان التاجي حالاته المختلفة .- إن وجود تغيرات في مستوى هرمونات الغدة الدرقية يتناسب مع شدة المضاعفات في مرضى إحتشاء الحاد لعضلة القلب .- ونحن ننصح في حالة دراسة هرمونات الغدة الدرقية في حالات المرضى المصابون بقصور الشريان التاجي بقياس النسبة الكلية لهرمونات التري أويودوثيرونين والثيروكسين وكذلك قياس هرمون ال تى . إس . إتش الخاص بالغدة النخامية .