

# Prevalence and prognosis of acute pulmonary edema complicating acute coronary syndrome

Shady Gamal Mohamed Oaf

الهدف من البحث(أولا) دراسة نسبة حدوث مرض الارتشاح الرئوي الناتج عن قصور الشرايين التاجية.ثانيا) مقارنة مرضى الارتشاح الرئوي بمرضى قصور الشرايين التاجية من حيث السن والجنس ، عوامل الخطورة على القلب والأوعية الدموية المسببة لقصور الشرايين التاجية ، الصورة الإكلينيكية ، نتائج موجات القلب الصوتية والقسطرة القلبية.الملخص العربي للرسالةتناولت هذه الدراسة مائتا وعشرة مريضا يعانون من قصور بالشرايين التاجية للقلب تمت متابعتهم بالعناية المركزة لأمراض القلب بمستشفى بنها الجامعي ومستشفى الطوارئ بالمنصورة (منهم ثمانية وثلاثون مريضا يشكرون من ارتشاح رئوي حاد ناتج عن قصور شديد بالشريان التاجي ، والباقي يشكرون من آلام الصدر المعتادة في قصور الشريان التاجي).وقد تم تشخيص هذه الحالات بناء على ايجابية اثنين أو أكثر من الخصائص التالية:أولا) الشكوى الاكلينيكية للمريض.ثانيا) التغيير الحاصل برسم القلب الكهربائي الخاص بالمريض.ثالثا) الزيادة بمعدلات انزيمات القلب بالدم.وقدمنا خلال هذه الدراسة ببحث الاختلافات بين المجموعتين السابقتين من النواحي التالية:أولا: الشكوى الاكلينيكية للمريض.ثانيا: عوامل الخطورة على القلب والأوعية الدموية والمسببة لقصور الشرايين التاجية.ثالثا: نوع قصور الشريان التاجي المسبب لشكوى المريض.رابعا: نتيجة معدلات انزيمات القلب ونسبة الغازات بالدم.خامسا: أشعة الصدر العادية والموجات الصوتية للقلب.سادسا: طبيعة ونسبة حدوث المضاعفات فترة الإقامة بالمستشفى.سابعا: نتائج قسطرة القلب التشخيصية والحاجة إلى القسطرة العلاجية أو عملية القلب المفتوح.ثامنا: متابعة المرضى خلال ثلاثة أشهر بعد الخروج من المستشفى وبحث أية مضاعفات.وجدنا أن نسبة احتشاء عضلة القلب أقل من باقي أنواع قصور الشرايين التاجية في حدوث الارتشاح الرئوي. وهذا ما يفسر قلة معدل ارتفاع إنزيمات القلب في مرضى الارتشاح الرئوي.ووجدنا أيضا أن المرضى الذين يعانون من الارتشاح الرئوي الناتج عن قصور الشرايين التاجية ترتفع بهم نسبة عوامل الخطورة على القلب والأوعية الدموية والمسببة لقصور الشرايين التاجية (ضغط الدم المرتفع - مرض السكر - التدخين - الاحتشاء السابق بعضلة القلب - سرعة في النبض - اضطراب ضربات القلب) عن المجموعة الأخرى ، بينما لم نجد اختلافا هاما من حيث السن أو النوع بين المجموعتين.كما تبين أن مرضى الارتشاح الرئوي يعانون من انخفاض شديد بكفاءة القلب وتضخم بعضلة القلب وارتفاع بالصمام الميترالي بنسبة أعلى من مرضى المجموعة الأخرى.ومن خلال هذه الدراسة وجدنا أن نسبة حدوث مضاعفات فترة الإقامة بالمستشفى مثل (اضطراب ضربات القلب - ضعف عضلة القلب - حدوث ارتشاح رئوي جديد - قصور جديد بالشرايين التاجية - وفاة مبكرة) كانت أعلى في مرضى الارتشاح الرئوي من مرضى المجموعة الأخرى. وبعد عمل قسطرة القلب التشخيصية للمرضى وجدنا أن نسبة انسداد الشرايين التاجية الثلاثة كانت أكثر وأعم في مرضى الارتشاح الرئوي بينما كانت نسبة انسداد شريان أو اثنين أعلى في المجموعة الأخرى. ولذا تم عمل عمليات القلب المفتوح بنسبة أكبر في مرضى الارتشاح الرئوي بينما كانت قسطرة القلب العلاجية كافية لمرضى المجموعة الأخرى.ومع متابعة مجموعتي البحث خلال ثلاثة أشهر بعد الخروج من المستشفى وجدنا أيضا أن مرضى الارتشاح الرئوي هم الأكثر عرضة لحدوث مضاعفات مثل (ضعف عضلة القلب - قصور جديد بالشرايين التاجية - ارتشاح رئوي متكرر) كما أنهما الأعلى في نسبة الوفيات عن مرضى المجموعة الأخرى وكان الاحتشاء الحاد بعضلة القلب هو المسبب الأكثر للوفاة.توصيات البحث:  
1- الحد من عوامل الخطورة على القلب والأوعية الدموية والمسببة لقصور الشرايين التاجية.  
2- عمل دراسة شاملة في نفس الموضوع تتضمن أعداد مناسبة وتشمل كافة القطر المصري.  
3- عمل

---

قسطرة القلب التشخيصية والعلاجية إذا لزم الأمر واستخدام الأدوية التي تعمل على توسيع الأوعية الدموية والشرايين التاجية ذات أهمية بالغة في الحد من المضاعفات المحتملة لقصور الشرايين التاجية.