

MODULATION OF RESPIRATORY FUNCTIONS OF BLOOD IN RESPONSE THE AGRICLTURAL AND INDUSTRIAL POLLUTION OF RIVER NILE IN TILAPIA "oreochromis niloticus".

Elsayed Elbastamy Elsayed

يُحدث التلوث تغيراً في مياه الأنهار والبحيرات والمحيطات في العالم بأسره ، وبالتالي يضر بصحة الإنسان والبيئة المائية. وفي مصر، هناك مصادر عديدة للتلوث مثل المخلفات الزراعية والصناعية والصرف الصحي والمصارف التي تصب مياهها في نهر النيل. وقد أجريت هذه الدراسة على مياه نهر النيل "فرع رشيد"، لتقدير تأثير التلوث الزراعي (بمياه مصرف سبل الزراعي الذي يقع في محافظة المنوفية (منطقة أولى) و يصب مياهه في فرع رشيد لنهر النيل) وكذلك تأثير التلوث الصناعي (منطقة كفر الزيات الصناعية والواقعة على الفرع (منطقة ثانية) وتصب المخلفات به أيضاً)، على الخواص الفيزيائية والكيميائية للمياه، وكذلك على الوظائف التنفسية لدم سمكة البلطي النيلي من هاتان المنطقتان. وقد جمعت عينات المياه وعينات سمك البلطي من منطقة التلوث الزراعي والصناعي بفرع رشيد وعينة من الفرع بالقناطر الخيرية كمجموعة ضابطة. وقد أوضحت نتائج الدراسة ما يلي: الخصائص الفيزيائية - الكيميائية للمياه: سجلت أعلى قيم لدرجة حرارة المياه في المنطقة الضابطة وكانت 18.03 م° وكانت أقل قيم لدرجة حرارة المياه في المنطقة الثانية وكانت 14.9 م°. وقد سجلت قيم الأس الهيدروجيني نفس معنوي إحصائياً أثناء الدراسة مقارنة بعينات مياه المنطقة الضابطة. أما عن قيم القلوية الكلية فسجلت أيضاً زيادة ذات دلالة إحصائية بمنطقتي الدراسة مقارنة بعينات المياه بالمنطقة الضابطة. وأوضحت نتائج التوصيل الكهربائي للمياه زيادة في منطقتي الدراسة مقارنة بعينات المياه الضابطة من مياه الفرع. وأظهرت الأملاح الكلية الذائبة والعلكارية زيادة ذات دلالة إحصائية في المنطقة الأولى والثانية مقارنة بعينات المياه بالمنطقة الضابطة. وقد أوضحت تركيزات الأمونيا في مياه فرع رشيد زيادة ذات دلالة إحصائية لكن أقصى ارتفاع كان بالمنطقة الأولى مقارنة بعينات المياه بالمنطقة الضابطة. وكان هناك نفس إحصائي في قيم الأكسجين الذائب في المياه في منطقتي الدراسة مقارنة بعينات المياه بالمنطقة الضابطة. وأوضحت نتائج الأكسجين الحيوي المستهلك والأكسجين المتطلب لأكسدة المواد العضوية زيادة ذات دلالة إحصائية في المنطقة الأولى والثانية مقارنة بعينات المياه بالمنطقة الضابطة. وأوضحت تحاليل الكاتيونات مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكلاسيوم والماغنيسيوم والأنيونات مثل الكلوريد والكبريتات والفوسفات والنترات زيادة ذات دلالة إحصائية وكانت أعلى قيم لها في المنطقة الأولى (فرع رشيد ما بعد مصرف سبل) مقارنة بعينات مياه المنطقة الضابطة. أما عن العناصر الثقيلة في الماء مثل الحديد والمنجنيز والزنك والنحاس والرصاص والكادميوم، فقد زادت زيادة ذات دلالة إحصائية أثناء الدراسة وبالأخص المنطقة الأولى. الهيموجلوبين: أوضحت النتائج زيادة تركيز الهيموجلوبين في دم سمكة البلطي في منطقتي الدراسة بالمقارنة إلى عينات السمك المأخوذة من الفرع "المنطقة الضابطة - القناطر الخيرية". الوظائف التنفسية للدم سمكة البلطي النيلبدراسة الوظائف التنفسية للدم وجد من نتائج غازات الدم والتوازن الحمضى القلوى أنه ربما حدث زيادة في معدل التمثيل الغذائي وزيادة في معدل استهلاك الأكسجين في المنطقتين خلال الدراسة بالمقارنة إلى العينات المأخوذة من فرع رشيد "المنطقة الضابطة" وكانت هناك نفس في ضغط ثاني أكسيد الكربون في عينة الدم المأخوذة من المنطقة الأولى. وجد أن منحنى التعادل الأكسجيني يقع جهة اليسار بفارق معنوية في ضغط التسليع النصفى للدم بالأكسجين في سمكة البلطي بمنطقتي الدراسة

بالمقارنة الى العينات المأخوذة من المنطقة الضابطة مما يدل على زيادة في قابلية الدم لحمل الأكسجين.