

# **Modern trends in management of complete rectal prolapse**

**Mohammed Abozeid Al Desoky**

إن لفظ (سقوط المستقيم) يدل على سقوط محيطي من المستقيم خلال الشرج، تصيب غالباً الأشخاص الكهول وصغار السن. هناك نوعان من السقوط الشرجي النوع الأول هو النوع الجزئي وفيه يبرز الغشاء المخاطي للمستقيم خارج فتحة الشرج ويطلق عليه غشائي أو غير كامل، أما النوع الثاني فهو الكامل الذي يشمل كل طبقات جدار المستقيم. السقوط الشرجي مرض يصيب كبار السن وكذلك الأطفال الأقل من ثلاث سنوات، معدل حدوث المرض في الرجال أقل كثيراً من النساء. سقوط المستقيم الكامل يعطى إحساس بعدم الراحة وذلك لوجود إحساس بسقوط جزء من الأمعاء من خلال الشرج قد يصاحب بحدوث التهابات مزمنة بالمستقيم وكذلك الإفرازات المخاطية التي تفرزها الأمعاء مع اتساع عضلة الشرج وعدم التحكم في عملية التبرز. سقوط المستقيم يحدث نتيجة ضعف في العضلات والأربطة المثبتة للمستقيم والسبب الرئيسي لحدوث سقوط المستقيم غير واضح ولكننه دائمًا مرتبط بالكبار سنًا والأطفال والإمساك والإسهال لفترات طويلة والحمل المتعدد ... الخ. السقوط الشرجي الغير كامل غالباً ما يصيب الأطفال ولكنه لا يحتاج إلى التدخل الجراحي في معظم الحالات. علاج السقوط الشرجي ينقسم إلى علاج دوائي وجرياحي وأخر تدخلي غير جراحي ومثال ذلك حقن مواد معينة من خلال منطقة العجان ، وتمارين لتقوية عضلات живот. يتم العلاج الجراحي عن طريق البطن أو من خلال منطقة العجان (أقل في المضاعفات أكثر في نسبة ارتفاع المرض). الجراحة بالمنظار طريقة تمتاز بأنها أمنة وسهلة وموفقة للمال بالمقارنة إلى الجراحات الأخرى. على الرغم من الدراسات التي تمت في هذا الموضوع إلا أنه لا توجد عمليه وحيدة مثاليه يمكن أن تقدم إلى جميع الحالات ومع ذلك لا بد أن يرتبط العلاج الجراحي مع العلاج الدوائي للوصول إلى امثل النتائج. الهدف من العمل: إن الهدف من هذا العمل هو دراسة الطرق المختلفة في تشخيص السقوط الشرجي مع تسلیط الضوء على التقنيات الجديدة في أسلوب العلاج.