

# **Study of abortion cases in benha university hospital in the last 5 years(2002-2006)**

**Atef Abd El Monem Mohamed**

الإجهاض هو إنهاء الحمل تلقائياً أو عمداً قبل أن يستطع الجنين الحياة خارج رحم الأم. و ذلك قبل الأسبوع العشرين من الحمل، أو يكون وزن الجنين أقل من خمسين جرام. ويعتبر الإجهاض من أخطر الأحداث التي تواجه السيدة الحامل وذلك لما له من مضاعفات كثيرة أخطرها وفاة الأم نتيجة للنزيف الحاد أو الصدمة الحادة أو الالتهابات المتفاقحة الشديدة ولذلك فيجب أن يكون هناك استعداد دائم لتقديم الخدمة الطبية لهؤلاء المرضى خاصة نقل الدم للمرضية مع أهمية مراعاة تطابق فصيلة الدم وقد تناول البحث حالات الإجهاض المختلفة وهي: الإجهاض، المنذر والإجهاض الحتمي وهو إما أن يكون كاملاً أو غير كامل والإجهاض المنسي والإجهاض المتكرر وتتناول البحث بعد ذلك تشخيص الإجهاض إكلينيكياً وأنواعه واهم طرق التعامل معه جراحياً أو دوائياً أخيراً إحصائيات طبية عن الإجهاض في بعض الدول النامية والمتقدمة. وقد نوه البحث إلى أهمية استخدام الموجات فوق الصوتية في تشخيص الإجهاض وأوجه الاختلاف عن الحالات المشابهة له مثل الحمل خارج الرحم وقد أعد البحث لإجراء دراسة إسترجاعية وتقييمياً للمعلومات في حالات الإجهاض بمستشفى بنها الجامعي في خمس سنوات من 2002 إلى 2006 ونظراً لتلف كثير من ملفات المرضى في السنوات ما قبل 2006 فقد أخذنا حالات عام 2006 كمثال للدراسة المفصلة ولقد تم تجميع المعلومات الازمة لهذه الدراسة من واقع تذاكر المرضى وسجلاتهم بأرشيف قسم الإحصاء بمستشفى بنها الجامعي ويبين البحث أن نسبة حدوث الإجهاض بالنسبة لحالات الدخول الكلية باستقبال الولادة في عام 2006 وهي 12% وقد تم حصر 673 حالة إجهاض عام 2006، وتم تقسيم وجدولة المعلومات المختلفة المدونة بتذاكر المرضى وتم إدخالها إلى الكمبيوتر وحصلنا منها على جداول ورسوم توضيحية مختلفة . ومن النتائج التي توصلنا إليها ما يأتي:- بيان بعدد حالات الإجهاض والنوع الإكلينيكي لكل منها كما يلي:- 55 حالة إجهاض منذر، 346 حالة إجهاض حتمي، 195 حالة إجهاض غير كامل، 35 حالة إجهاض منسي، 39 حالة إجهاض متكرر -0- النزيف الرحمي كعرض أساسى للإجهاض تمثل في 569 حالة بنسبة 84 من مجموع الحالات الكلية -0- تم عمل فحص بالموجات فوق الصوتية في 96 حالة -0- تم إجراء نقل دم لـ 19 حالة -0- الحالات التي وضعت تحت الملاحظة وعولجت تحفظياً 43 حالة -0- الحالات التي تم تفريغها عن طريق التحرير الطبي باستخدام الهرمون النخامي 85 حالة -0- الحالات التي تم تفريغها جراحياً عن طريق المهبل 471 حالة -0- الحالات التي تم تفريغها عن طريق التحرير الطبي والتفرغ الجراحي المهيلي 27 حالة -0- الحالات التي عولجت بعملية ربط لعنق الرحم نتيجة الإجهاض المتكرر 17 حالة و من هذا البحث نوصي بالآتي:- ٠ الإهتمام بحفظ تذاكر المرضى بأرشيف المستشفى ٠ استكمال وتدوين المعلومات المتعلقة بالتاريخ المرضي والفحوص وطرق العلاج المتبعة بدقة في تذاكر المرضى . لزوم إجراء الفحوصات المختلفة وخاصة الفحص بالموجات فوق الصوتية للمرضى ٠ لزوم توافر نقل الدم للمرضى مع أهمية مراعاة تطابق فصيلة الدم حتى لا تتعرض المريضية لمضاعفات خطيرة ٠ إضافة جدول ملخص يحتوي على المعلومات الطبية الهامة في نهاية تذكرة المريضه لضمان الحصول على المعلومات المهمة ٠ من الضروري أن يحتوي أرشيف المستشفى على معلومات طبية أكثر دقة وتفصيلاً.