

Effectiveness of uterine compression u- sutures in management of primary postpartum hemorrhage after caesarean section

Hala Abd El-Elah Radwan Abd El-Whab

المقدمة يعرف نزف ما بعد الولادة الأولى أنه يحدث خلال الأربع وعشرين ساعة التي تلى الولادة مباشرة، ويترى البعض أن أي درجة من النزيف تؤثر على الحالة العامة للسيدة مسبباً الهبوط في الدورة الدموية وما يتربى عليه من آثار خطيرة على كافة أعضاء الجسم يمكن تعريفه على أنه نزيف ما بعد الولادة ويعود السبب في حدوث نزيف ما بعد الولادة في أغلب الحالات إلى عدم حدوث انقباض جيد في عضلة الرحم بسبب عدم قدرة الرحم على الانقباض عقب أجهاد ولادة الجنين أو بسبب وجود بقايا من المشيمة عالقة بجدار الرحم والتي قد تحدث نتيجة لعيوب في تكوين والتتصاق المشيمة بالرحم ومن الأسباب الأخرى الهامة وجود جروح وتهتكات بالجهاز التناسلي نتيجة للولادة مما يؤدي للنزيف إذا تركت بدون تدخل جراحي وهناك أسباب عامة مثل وجود سيولة بالدم تؤدي إلى عدم تجلط الدم بشكل جيد ومن أكثر الأسباب شيوعاً تراخي عضلة الرحم بعد الولادة نتيجة الولادة المتعترة أو كثرة عدد الولادات وقد أثبتت الدراسات والممارسة القائمة على الدليل أن التدخل الفعال والمبكر قبل ولادة المشيمة وبعد ولادة الجنين مباشرة في صورة إعطاء أدوية قابضة للرحم تؤدي إلى تقليل الدم المفقود ومنع حدوث النزيف وإذا فشلت هذه المحاولات فإننا نلجأ إلى الطرق الجراحية التي تشمل ربط الشريان الرحمي والشريان المبيضي وشريان الإ iliocaval وأخيراً إذا فشلت كل هذه المحاولات فإننا نقوم بعمل استئصال رحمي وثمرة طرق حديثة تستخدم في علاج الحالات الصعبة من نزف ما بعد الولادة وتهدف كل هذه الطرق للمحافظة على الرحم للإنجذاب بعد ذلك، بالإضافة إلى كونها طرق جيدة وسهلة في علاج نزيف ما بعد الولادة ومن هذه الطرق:- طريقة الـ Bi- لينش ومنحوراتها والتي تهدف إلى ربط الرحم بطريقة معينة كي يتم وفق النزف- طريقة ربط الأوعية الدموية التي تغذى الرحم بطريقة معينة وقريبة بحيث تقلل من كمية الدم المتوجه للرحم بدرجة تسمح بتجلط الدم في الرحم ووقف نزف ما بعد الولادة- طريقة الأشعة التداخلية وذلك بحقن مواد خاصة تسبب انسداد الشريانين التي تغذى الرحم ويسعى العلماء لتطوير الطرق المستخدمة أو ابتكار طرق جديدة طبية أو جراحية لعلاج نزف ما بعد الولادة تكون أسرع وأكثر فاعلية من الطرق المستخدمة الآن ومنها عمل غرزة على شكل حرف Ua بطريقة معينة لوقف النزف وهي طريقة جيدة وسهلة الهدف من البحث تستهدف هذه الدراسة تقييم مدى فاعلية عمل غرز على شكل حرف (U) في حالات النزف الأولى بعد الولادة القيصرية أجريت هذه الدراسة على 40 حالة من حالات النزيف الأولى بعد الولادة القيصرية بمستشفى بنها الجامعي ومستشفى التأمين الصحي بنها، وقد أثبتت النتائج مدى سهولة وفاعلية عمل الغرز الرحمية على شكل حرف (U) لوقف النزيف الأولى بعد الولادة القيصرية وقد تمت ملاحظة الحالات بعد الولادة وإعطاء المضادات الحيوية