

Evaluation of women presented with postcoital bleeding by vaginal cytology and colposcopy

Sherein Mohammed Ibrahim

توجد أدلة عديدة للنزف الدموي من المهبل بعد الممارسة الجنسية مثل :- وجود قرحة على سطح عنق الرحم ، مما يساعد على رشح الدماء من الشرايين السطحية- نمو شاذ في عنق الرحم- زوائد لحمية في عنق الرحم- زوائد لحمية رحمية ، وتحدث عندما تنمو بطانة الرحم وتسبب تواءات- اورام ليفية رحمية حميدة- عدوى بكتيرية بـ الكلاميديا- داء المشعرات المهبلية- عدوى فطريات المهبل ، ويصاحبها حكة وحرقان و رائحة كريهة وافرازات مهبلية- التهاب بطانة الرحم- السيلان- التهاب المهبل- تناول حبوب من الحمل لسنوات طويلة- اضطراب الدورة الشهرية لأسباب نفسية هرمونية- مرض سرطاني خبيثالغرض من الدراساتقييم الحالات من النساء المصابةين بالنزف الدموي من المهبل بعد الممارسة الجنسية وذلك بالفحص الاكلينيكي واخذ مسحه من المهبل ثم الفحص بمنظار عنق الرحم .طرق الدراسهسوف تم الدراسة على النساء المصابةين بالنزف الدموي من المهبل بعد الممارسة الجنسية وسوف يتم اختيار الحالات من المرضى المتعددين علي قسم النساء والتوليد بمستشفى بنها الجامعيسوف يتم عمل فحص اكلينيكي و اخذ مسحه من المهبل وسيتم اختيار الحالات التي تظهر مؤشرات خلايا متغيره لدراستها بواسطه بمنظار عنق الرحم. وقد تم ادراج ملفات 50 سيدة النساء المصابةين بالنزف الدموي من المهبل بعد اجراء الممارسة الجنسية ومن لهم نتائج فحص خلوى ونتيجة فحص بمنظار عنق الرحم و نتيجة الفحص الهيستوباثولوجي. وعند تحليل النتائج احصائيا تم استبعاد 4 نتائج لعدم ملائمة العينات للفحص الهيستوباثولوجي. وقد اظهرت هذه الدراسة وجود قرحة على سطح عنق الرحم و التهاب المهبل و زوائد لحمية في عنق الرحم (بوليبات عنق الرحم) السبب الاساسي في النزف الدموي بعد الجماع بنسبة 84% وبذلك أظهرت نتائج الدراسة ان ورم الحليمي البشري عالي يشكل ملحوظ بالمجموعه الغير طبيعيه بالفحص الهستولوجي وقد اوصت هذه الدراسة بضرورة خضوع كل النساء المصابةين بالنزف الدموي من المهبل بعد الجماع للفحص الخلوى .