
Prospective survey of risk profile and in-hospital outcome for patients with acute coronary syndrome at benha university hospital

Neveen Zakaria El-Jorakey

اشتملت الدراسة الحالية على 100 مريض من مرضى قصور الشريان التاجي الحاد بوحدة رعاية القلب بمستشفى بنها الجامعى وهدفنا فيها دراسة نسبة الحدوث والاتجاهات المحتملة لعوامل الخطورة في مرضى قصور الشريان التاجي بمستشفى بنها الجامعى في الفترة من سبتمبر 2009 إلى فبراير 2010. اشتملت الدراسة 100 مريضاً من بينهم 66 من الذكور (66%) و34 من الإناث (34%). وتنوعت حالات قصور الشريان التاجي بين المرضى حيث كان هناك 38 مريضاً (38%) يعانون من جلطة بالشريان التاجي مصحوبة بارتفاع مقطع الـ (ST)، 19 مريضاً (11%) يعانون من جلطة بالشريان التاجي غير مصحوبة بارتفاع مقطع الـ (ST)، و51 مريضاً (51%) يعانون من ذبحة صدرية غير مستقرة. وتم دراسة نسبة عوامل الخطورة بين المرضى حيث وجد أن 55% مدخنون، 42% يعانون من مرض السكري، 50% من مرضى ارتفاع ضغط الدم الشريانى، 51% يعانون من ارتفاع نسبة الدهون بالدم، 44% يعانون من السمنة وكان 22% لديهم تاريخ عائلى إيجابى من أمراض الشريان التاجية. وجد في مرضاناً أن الصدمة القلبية حدثت في 4% من المرضى، إحياء سكتة قلبية في 2%، ارتشاح رئوي في 4% وعدم انتظام ضربات القلب في 12% من المرضى ولم يكن هناك حالات وفيات في الدراسة الحالية.