

Treatment of some organic pollutants using -actiivated carbon dreived from local agro residues

Mohammed Refaat Hassen

يعتبر الثلاثي هالوميثان من النواتج الثانوية التي وجدت في الماء بعد عملية التطهير باستخدام الكلور. وهذه المركبات هي الكلوروفورم والبروموفورم ودي بروم ميثان ودي بروم كلوروميثان. ويعتبر المستوي الاقصى للتلوث بالتري هالوميثان الكلية 100 ميكرو جرام / لتر وفقاً لوكالة الحماية البيئية الأمريكية لعام 1979. والإستهلاك المطهول للماء الصالح للشرب الذي يحتوي مستويات عالية للثلاثي هالوميثان قد يسبب أمراض الكبد والكلوي والمثانة، وأمراض الجهاز العصبي المركزي، وقد يؤدي إلى احتمال الإصابة بالسرطان. وهذه الرسالة تدرس إمكانيات إزالة للثلاثي هالوميثان من ماء الشرب باستخدام الكربون المنشط المحضر من بذور الزيتون بالإضافة إلى دراسة عملية الامتزاز. وتشمل الرسالة على ثلاثة فصول: الفصل الأول يقدم خلفيّةً تاريخيّةً ومعلومات كيميائيةً لعدة مطهرات استعملت مثل استخدام الكلور والكلور أمين و ثاني أوكسيد الكلور والأوزون والتقطير باستخدام الأشعة فوق البنفسجية أيضاً، كما يتضمن نواتج التطهير الثانوية والعوامل التي تؤثر على تشكيل هذه النواتج و يتعرض خطرها الصحي. والطرق المستخدمة لإزالة الثلاثي هالوميثان من المياه وهذه الطرق: الأكسدة والتهوية والامتزاز والمزعلي الكربون المنشط الحيبي أحد الطرق الأكثر فاعلية ويتناول طرق تحضير الكربون المنشط وطرق التنشيط وتركيبه المجموعات على سطح الكربون المنشط بالإضافة إلى استعراض للمراجعة العلمية لاستخدام بذور الزيتون كبادرة للكربون المنشط. الفصل الثاني يحتوي على الجزء التجاري وفي هذا الجزء تم استخدام بذور الزيتون كبادرة لتحضير أربع عينات من الكربون المنشط باستخدام الطريقتين الآتيتين: 1- فيزيائياً باستخدام مخلوط غاز التتروجين مع بخار الماء 2- كيميائياً باستخدام حمض الفسفوريك . و الأربع عينات هم (OSN-1850; OSP70-2500; OSP60-2500; OSP80 and 2500) تم فحص الخواص الفيزيو كيميائية ل الأربع ممتزة باستخدام طرق مختلفة . وفي هذا الجزء تم تحديد الكثافة الحجمية والاس الهيدروجيني وظيف الامتصاص بالأشعة الحمراء ومساحة السطح وحجم المسام. وتم دراسة العوامل المؤثرة على عملية الامتزاز (الوقت وتركيز المادة الممتزة وكتلة المادة المازة والاس الهيدروجيني ودرجة الحرارة) ل الأربع ممتزة . وتم اختبار الدراسات الحركية والانتشارية . وتم تطبيق البيانات العملية للاتزان الديناميكي لل الأربع ممتزة طبقاً لنماذج لانجمير و فرونديليش . تم دراسة التحلل بالأشعة فوق البنفسجية للثلاثي هالوميثان عن طريق تعريضها لمدة 25 دقيقة لكل من: 1- الأشعة فوق البنفسجية فقط 2- الأشعة فوق البنفسجية في وجود الكربون المنشط المشتق من بذور الزيتون 3- الأشعة فوق البنفسجية في وجود الكربون المنشط المشتق من بذور الزيتون المحمل عليه التتانيوم دائياً اووكسيد . الفصل الثالث يتضمن عرض النتائج ومناقشتها في هذه الرسالة وتم فحص الخواص الفيزيو كيميائية للمواد الممتزة المحضرة من بذور الزيتون. حيث وجد ان العينة OSN-1850 المجهزة بالطريقة الفيزائية لها كثافة حجمية اقل 0,671 جم/ ملي لتر والسطح المعرضة الاساسية عند اس هيدروجيني 10,4 بينما العينات التي تم تحضيرها من بذور الزيتون بالطرق الكيميائية وهي OSP 60-2500; OSP 70 - 2500 and OSP80- 2500 بين ما عالية حجمية كثافة لها 0,776- 0,833 جم / لتر وتعطى اس هيدروجيني اقل من 4 . واوضح طيف الامتصاص بالأشعة تحت الحمراء اهتزازات امتدادية لوجود عدد من المجموعات مثل C≡C , C=C , O-C , H-C , OH , NH2 وبصفة عامة، خواص الكربون المنشط المحضر من بذور الزيتون ترتيبها كالتالي: SBET < 2500-OSP80 < 2500-OSP70 < 2500-OSP60

فوق البنفسجية فى وجود الكربون المنشط المشتق من بذور الزيتون3- استخدام الاشعة فوق البنفسجية فى وجود الكربون المنشط المشتق من بذور الزيتون المحمل بالتنانيوم دائى اوكسيد . تبين ان نسبة ازالة الثلاثي هالوميثان افضل فى وجود الكربون المنشط المشتق من بذور الزيتون المحمل بالتنانيوم دائى اوكسيد . وهذا يمكن تفسيره بزيادة معدل امتصاص الثلاثي هالوميثان على الكربون المنشط المشتق من بذور الزيتون بعد تعرضه للاشعة فوق البنفسجية و فى وجود التنانيوم دائى اوكسيد . على أساس هذه الدراسة، يُستنتج بأنّ تقنيات الإزدواج التي تجمع بين خاصية الامتصاص و خاصية التحلل بالأشعة فوق البنفسجية لها تأثير اكبر لازالة الثلاثي هالوميثان من محلول .