

Recent trends in management of perianal fistula

Youssef Mohamed Fady

التوصيات الحديثة في تشخيص وعلاج الناصور الجار شرجي1الملخص العربيالناصور الشرجي يعتبر من الحالات الشائعة ، تعد نسبة حدوثه بالنسبة الى الاناث 6.5 لكل 0 كل 0.11.111 . بذا المرض عادة ما يحدث في العقد الثالث .. 011.111 حالة اما الرجال فتعتبر او ال اربع من العمر. ويعتقد ان المرض سبب التهاب في الغدد الدخامية بين الصمامين مما يبداء الناصورالشرجي الداخمي (ano in fistula) (بما يسمى نظرية التهاب الغدد الدخامي . نظام تقسيم الناصور الى ناصور بين الصمام ، ناصور خلال الصمام ، ناصور فوق الصمام وناصور خارج الصمام . عمى الرغم من ذلك نوع العلاج لا يعتمد عمى موقع الناصور من خلال الصمامولكن يعتمد عمى مستوى الفتحة الدخامية لمناصور.الناصور المنخفض يمثل اقل من ثمت الحالات و تعالج من خلال فتح الناصور الشرجي (fistulotomy) مع نسب نجاح عالية اما بالنسبة الى حالات الناصور العالى فيى تمثل تحدي ج ا رحولذلك تتعدد اساليب العلاج من عمل رقعة متقدمة استخدم الصمغ الميفي . ومع ذلك فإن نسب الفشل فيه الحالات يتراوح من 1 % الى 51 % مع الرقعة المقدمة.مجموعه من العمماء اقاموا بحثا عمى 10 حالة تشمل ناصور فوق الصمام وخلال الصمام وخارج% الصمام تم عمل رقعة مخاطية متقدمة ليهم وجد ان نسب نجاح العمماء تقارب 13 .الصمغ الميفي يعد بديلا عن الرقعة المخاطية المتقدمة ولكن مع نسب التأام اقل من المعدل لمرقعةالمتقدمة .وبذه النسبة تعد منخفضة بمعدل 05 %. وتعد سيولة الصمغ الميفي احد اسباب ذه النسبةالمنخفضة لإمكانية تسربها خارج مجرى الناصور خلال ارتفاع الضغط الداخمي .التوصيات الحديثة في تشخيص وعلاج الناصور الجار شرجي2ويعد من التوصيات الحديثة لعلاج اغلاق فتحة الناصور الداخمي عن طريق عملية لإستئصالالناصور دون جرح الصمام الشرجي الداخمي او عن طريق استئصال الناصور عمى ثلاث م ارحل او تقميلحجم الانسجة المكشوفة بعد استئصال الناصور.ومن طرق العلاج الحديثو ابتكر جونسون ومجموعتو البحثية كتمة طبيعية لغمق الناصور والتي نالتموافقة من منظمة الصحة والغذاء الامريكية والتي تصنع من امعاء الخنزير ومن ممی ازت بهذه الكتمة مكافحتها الطبيعية للالتهابات ولا ينتج الجسم مضادات الاجسام الغربية نتيجة لذلك وبذه الكتمة تأخذ فترة حوالى ثلاثة شهور حتى تتوافق تماما مع انسجة الجسم .بذه المادة يتم تشكيميا في صورة اسطوانية ويتمادخليا عبر الناصور، وتعتبر النتائج المترتبة عمى ذه الطريقة في العلاج لعلاج 06 حالة وتمت مقارنة النتائج مع الحالات التي عولجت بالصمغ الميفي في المرضى الذين يعانون من ناصور شرجي عالى ماعدا مرضى التهاب القاولون كرونز كانت النتيجة 73 % لمحالات التي عولجت بالكتمة الطبيعية عن التي عولجت بالصمغ الميفي .