

Helicobacter pylori infection and chronic urticaria

Nehad Mohammed Abd El-aziz Halima

الملخص العربي يعتبر مرض الشري المزمن الغير معروف السبب نوع من أمراض الشري حيث تكرر فيه الإنتبارات الشروية في معظم الأيام في مدة 6 أسابيع على الأقل بدون تمييز سبب معين ونظرًا لشروع الحالة المرضية، ونظرًا لأن سبب المرض متقلب ويمكن التعرف عليه بسهولة إلا أنه كثيراً ما يرافق المرض أحداث مصاحبة وبالرغم من أن الإصابات الفطرية والبكتيرية والغذاء والدواء والشذوذ الأيضي أو الهرموني أو الحالات الخبيثة أو العوامل النفسية كلها متهمة إلا أن إثبات علاقة هذه الأسباب بالمرض عادة تكون مفقودة. ومن الأسباب المحتملة التي نحن بصددها في هذا البحث هو الهليكوباكتريلورى وهو من الميكروبات الدقيقة المحبة للهواء والسلبية لصبغة جرام والحلزونية الشكل ذات الزوائد السوطية التي تصيب الغشاء المخاطي المبطن للمعدة في معظم المرضى بقرحة الأنف عشر وحوالي 80% من المرضى بقرحة المعدة وتعتبر من العوامل الخطيرة في الإصابة بسرطان المعدة و لاكتشاف دور الهليكوباكتريلورى في مرض الشري المزمن لقد قمنا بفحص 30 مريض بالشري المزمن الغير معروف السبب تم اختيارهم من العيادة الخارجية للأمراض الجلدية بمستشفى بنها الجامعى. ويكون المرضى من 22 سيدة و 8 رجال وتراوح أعمار المرضى من 16 إلى 63 سنة وتتراوح مدة المرض من ستة أسابيع إلى 18 سنة وقد تم عمل تشخيص أولى للمرضى بالشري المزمن الغير معروف السبب عندما لا يمكن توضيح العوامل المسيبة لأغلبية الإصابات بالفحص الإكلينيكي والتاريخ المرضى وقد مثل مجموعة الضوابط 10 من المتطوعين في مختلف العمر و اختلف الجنس وبعد موافقة المجموعات على إجراء منظار للمعدة وأخذ عينة من الغشاء المبطن لها 0 تمأخذ هذه العينات وبصبغة هيماتوكسيلين وأيوسين وبصبغة جيمازا لتحديد وجود ميكروب الهليكوباكتريلورى وجود الالتهابات بالمعدة فكانت النتيجة وجود الميكروب في 24 حالة من المرضى المصابين بالشري المزمن و 6 حالات من المتطوعين و أثبتت العلاقات الإحصائية وجود ذو دلالة وأهمية للهليكوباكتريلورى في مرض الشري المزمن كما تبين أيضاً وجود ذو دلالة وأهمية بين درجة الشري ودرجة الالتهاب المعدى مما يدعم العلاقة بين مرض الشري المزمن الغير معروف السبب والهليكوباكتريلورى كسبب من الأسباب المحتملة ونستخلص من هذه الدراسة أن نسبة انتشار الهليكوباكتريلورى عالية في مرض الشري المزمن المشتركين في الدراسة ولذلك نوصي بضرورة تحري وجود الميكروب في مرض الشري المزمن وخاصة إذا كان هؤلاء المرضى يعانون من متاعب بالمعدة حيث أن علاج هذا الميكروب قد يساعد في شفاء الشري المزمن لهؤلاء المرضى 0