

study of serum e-selectin in type II diabetes mellitus

shams el doha mohamed ezzat

وقد اشتملت على 59 شخص غيرانون من مرض السكر من النوع الثاني و(9: سنة) 7 ذكر - وُجد له هم مُكروه اليوم نُ ف البول واعمارهم تتراوح ما بُنْ 79 و 8 انشى (. * المجموعة الثانية : وقد اشتملت على 59 شخص غيرانون من مرض السكر من النوع الثاني 5: سنة) 8 - وُجد له هم مُكروه اليوم نُ ف البول وتتراوح اعمارهم ما بُنْ 84 ذكر و 7 انشى (. * المجموعة الثالثة : وقد اشتملت على 59 شخص غيرانون من مرض السكر من النوع الثاني 4: سنة) : - ولد هم وجود واضح للبروت نُ ف البول وتتراوح اعمارهم ما بُنْ 84 ذكر وانشى (. * المجموعة الرابعة : وقد اشتملت على 54 اشخاص اصحاء ظاهر ا كمجموعة ضابطة تترواح4: سنة) 9 ذكر و 9 انشى (. - اعمارهم ما بُنْ 79 ومن خلال هذه الدراسة تم ق اس مستوى ال اي - سب لُكت نُ ف الدم بطر فةالال زا. تتم ز المجموعة الضابطة بمعدل طب ل اي - س لُكت نُ المذاب وقد اظهرت هذه الدراسة ما يلي :- 5 وجود ارتفاع ذو دلالة احصائى ه ف مستوى ال اي - س لُكت نُ المذاب ف المصلف المجموعات الثلاثة المصابة بمرض السكر بالمقارنة مع المجموعة الضابطة .- 6 عدم وجود اختلاف ذو دلالة احصائى ه ف مستوى ال اي - س لُكت نُ المذاب ف المصل ب نُ المجموعة الاولى والثان ه لكن هناك اختلاف ذو دلالة احصائى ه ف مستوى ال اي - س لُكت نُ المذاب ف المصل ب نُ المجموعة الثالثة وكلا منالمجموعة الاولى والمجموعة الثان ه .- 7 وجود علاقة طرد ه ذو دلالة احصائى ه ب نُ مستوى ال اي - س لُكت نُ المذاب ف المصل ف مجموعات المرضى ومدة الاصابة بمرض السكر .- 8 وجود علاقة طرد ه ذو دلالة احصائى ه ب نُ مستوى ال اي - س لُكت نُ المذاب ف المصل ومستوى السكر الصائم والفاطر و الجل گوه مُوجلوب نُ .- 9 وجود علاقة طرد ه ذو دلالة احصائى ه ب نُ مستوى ال اي - س لُكت نُ المذاب ف المصل ف مجموعاتالمرضى وضغط الدم .:- وجود علاقة طرد ه ذو دلالة احصائى ه ب نُ مستوى ال اي - س لُكت نُ المذاب ف المصل ونسبة البروت نُ ف البول .ويستنتج من هذه الدراسة الاتي :-ز ادة مستوى ال اي س لُكت نُ ف مرض السكر عن الاصحاء وهذا ثما استخدامه كمؤشر لحدوث المضاعفات وخاصة الالت تحدث ف الاروع ه الدمو ه وكذلك كمؤشر لتنظيم ه مستوى السكر في هؤلاء المرضى .