
Sexual disorders in depression and schizophrenia patients

Sayed ???? Zaid Abd Elmawgoud

شهدت العقود القليلة الماضية اهتماماً كبيراً من الباحثين بدراسة الخصائص الإكلينيكية والديمقراطية لدى مرضى الاكتئاب والفصام التي يمكن أن تلعب دوراً كبيراً أوحى صغيراً في نشأة هذين الاضطرابين أو استمرارها أو تعترض سير البرامج العلاجية لهؤلاء المرضى بغرض تحقيق المزيد من الفهم الواسع لهذين الاضطرابين وتوفير أفضل سبل العلاج للمرضى ولاشك أن كل ما يتم التواصل إليه من معلومات في هذا الصدد يعتبر مغنماً كبيراً لكل المتخصصين في مجال علم النفس والطب النفسي من خبراء أكاديميين وممارسين إكلينكيين وفي مقدمة الموضوعات التي كانت في بؤرة الاهتمام الاضطرابات الجنسية. فالاضطرابات الجنسية على اختلاف أنواعها من اختلالات فسيولوجية ونفسية وانحرافات لدى المرضى اليكأترين علق عليها الكثير من الباحثين والإكلينكيين لاسيما لدى مرضى الاكتئاب والفصام وأجريت العديد من الدراسات في هذا الجانب وكشفت نتائجها عن أن ما يقرب من 21-82% من مرضى الاكتئاب ومرضى الفصام يعانون من واحد أو أكثر من أشكال الخلل الجنسي واختلف النظرة إلى طبيعة العفة بين الاضطرابات الجنسية وكل من الاكتئاب والفصام إذ يرى البعض أن هذه الاضطرابات الجنسية موجودة لدى المرضى قبل أن يسقطوا في براثن المرضى النفسي والبعض الآخر يرى أنها نتيجة للمرضى النفسي وليست سبباً له.